

GIGANTOMASTIA PREPUBERAL: REPORTE DE UN CASO

DR. GIL OBREGÓN BALLESTER*
Esp. 1er Grado Cirugía Plástica
Hosp. "Gral. Calixto García Iñiguez"
Teléfono: 202-3635
lloca@infomed.sld.cu

La gigantomastia, aumento desproporcionado de las mamas, no es frecuente en adolescentes y menos aún en etapa prepuberal. Esta patología conlleva en estos pacientes trastornos psíco-emocionales, además de limitaciones físicas, debido al peso y volumen de estas.

En el presente trabajo se expone un caso interesante y poco frecuente de una niña haitiana de 13 años en etapa prepuberal, con una gigantomastia bilateral de aproximadamente 13 Kg de peso, a la cual se le aplicó una técnica quirúrgica denominada Skoog con pedículo externo, para conservar la sensibilidad del complejo areola-pezones, que desaparece con la técnica de injerto libre de pezón que era la de elección en este caso debido a la longitud del pedículo. Esta operación fue realizada en el Hospital Universitario Puerto Príncipe.

Se logra una reducción significativa del volumen mamario, conservándose la viabilidad del complejo areola-pezones sin complicaciones, desapareciendo las alteraciones psíco-emocionales y físicas que presentaba la paciente, con la consiguiente incorporación a todas las actividades propias de su edad.

* Ponente. Tema libre. Cirugía Reconstructiva y Quemados.