

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA
TITULO: **ERGOFEINA 2. EFECTOS INDESEABLES**
GUION: MARIA DEL CARMEN BALEA
ASESOR. J. PEREZ PEÑA
ASESORA T.V: ODALYS GONZALEZ

IMAGEN

SONIDO

ESC.1

INTERV. DR. PEREZ

Conductor:

La Ergofeína es una combinación a dosis fija de 2 medicamentos: la ergotamina y la cafeína. Pertenece al grupo de los antimigrañosos. La Ergotamina actúa sobre el SNC y los vasos sanguíneos. Este medicamento se utiliza en el tratamiento de la crisis migrañosas, aunque en los últimos años se ha venido reduciendo su uso pues existen nuevos medicamentos más efectivos y seguros. No obstante, todavía tiene un espacio en los tratamientos farmacológicos. Pero como todos los fármacos su uso conlleva riesgos y efectos indeseables.

Esc.2

Pg de joven en la oficina revisando y estudiando unos documentos que están encima del buró en diferentes carpetas junto con su asistente, su asistente sale de cámara para avisar al cliente que puede pasar.

Pm de joven

Pm de asistente saliendo

.

Esc. 3

Pm de abogada que continua revisando documentos, regresa el asistente con el cliente, conversan sobre el caso.

Pp de cliente

Pp de asistente

(La madre cuenta la historia)

Mi hija es abogada, trabaja en una notaria cercana a nuestra casa. Se graduó recientemente con diploma de oro. Está contenta, le gusta el trabajo que realiza. Se esfuerza mucho porque todo le quede bien, es muy exigente.

Desde que estudiaba en la universidad padecía de migraña y ha tenido varios tratamientos. **El último medicamento que ha estado tomando es la ergofeína**, se siente aliviada cuando lo toma.

Esc. 4

Pm de abogada saliendo tarde de la oficina.

Pp de abogada.

Lleva varias semanas ocupada atendiendo un caso complicado, pasa muchas horas en la oficina y llega tarde a casa.

Esc. 5

Pg de mujer que ve entrar a la hija con el rostro contraído, se saludan y conversan.

Pp de hija

Pp de madre

Casi todos los días se queja de fuertes dolores de cabeza. **Le aconsejé que comenzara a tomar la Ergofeína para superar esta crisis.** Me prometió que a la mañana siguiente empezaría a tomar el medicamento.

Esc. 6

Pp de teléfono sonando.

Pm de joven abogada que lo descuelga y comienza a conversar con su madre, le comenta sobre la persistencia del dolor.

Me quedé preocupada y la llamé al trabajo, seguía con migraña y se había tomado dos pastillas más.

Esc. 7

Pm de madre que entra al cuarto con el medicamento para su hija, la encuentra sentada en la cama y le da el medicamento, la joven lo toma y se acuesta

Pp de joven con rostro contraído por el dolor que cierra los ojos para tratar de dormir.

Pp de madre preocupada.

Cuando regresó a casa, por la tarde, estaba desesperada del dolor de cabeza tan fuerte. Entró en su cuarto, no tenía ni deseos de hablar. Me pidió que le llevara la tableta, la tomó y se acostó.

Esc. 8

Pm de joven que llega a la sala donde está la madre, sintiéndose mal, con náuseas, mareos, dolores en las piernas, le cuenta y conversan.

Pp de joven

Pp de madre

Pasó un rato y despertó sintiéndose peor, sentía náuseas, mareos y dolores en las piernas, no pudo ni probar bocado. Le preparé un refresco y volvió a acostarse.

Esc. 9

Pm de muchacha sentada a la mesa organizando unos documentos, la madre viene hacia ella y conversan, ella comienza a sentirse mal, se siente muy débil y siente ardor en los dedos de las manos y los pies.

Pm de madre asustada.

Pp de joven con rostro desencajado.

A la mañana siguiente, se levantó más aliviada, pero todavía sentía dolor. Se tomó entonces la tableta para evitar que el dolor se agudizara. Ya se disponía a salir para el trabajo cuando comenzó a sentir sensación de ardor en los dedos de las manos y los pies y mucha debilidad.

Esc. 10

Pp de cartera y llaves, una mano las toma y sale de cámara.

Pm de madre e hija saliendo para el hospital.

Pp de madre muy preocupada

Pp de hija adolorida.

ESC. 11

INTERV. DR. PEREZ

Los síntomas que presentaba eran muy raros, debíamos consultar con un especialista, la convencí y fuimos al servicio de urgencias más cercano. Allí el médico decidió suspenderle las tabletas de Ergofeína.

Conductor:

Esta paciente ha sufrido los efectos indeseables del uso de la ERGOFEINA. En este caso la Ergotamina actuó sobre algunos receptores especiales de las células del cerebro y los vasos sanguíneos de las extremidades, lo que le provocó los síntomas y signos que padeció la paciente. Pudo haber sido peor, se han descrito casos de gangrena por uso prolongado de este medicamento. No se automedique. Consulte su médico.