

PROGRAMA: LA DOSIS EXACTA
TITULO: INTERACCIONES DEL ALCOHOL Y ALGUNOS MEDICAMENTOS
GUIÓN: MARIA DEL CARMEN BALEA
ASESOR. J. PÉREZ PEÑA
ASESORA T.V: ODALYS GONZÁLEZ

IMAGEN

SONIDO

ESC.1

INTERV. DR. PEREZ

CONDUCTOR:

EL ALCOHOL ETÍLICO TAMBIÉN CONOCIDO COMO ETANOL ES UNA DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS MÁS CONSUMIDAS EN EL MUNDO. DEBE SER CONOCIDO POR LOS PACIENTES EL POTENCIAL DE EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDE TENER EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE UN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y ES UNA PREGUNTA HABITUAL EL CONOCER SI ESTÁ PERMITIDO INGERIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS MIENTRAS SE TOMAN DETERMINADOS MEDICAMENTOS. UNO DE LOS MEDICAMENTOS MÁS CONSUMIDOS Y DE MAYOR RIESGO DE INTERACCIÓN CON EL ALCOHOL ES EL PARACETAMOL. ESTE MEDICAMENTO PERTENECE AL GRUPO DE LOS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS, ACTÚA INHIBIENDO UNA SUSTANCIA QUE ESTA RELACIONADA CON LA APARICIÓN DEL DOLOR LLAMADA PROSTAGLANDINA. ES UN BUEN MEDICAMENTO Y SE CONSUME EN TODO EL MUNDO, EN CUBA SE CONSUMEN MAS DE 130 MILLONES DE TABLETAS AL AÑO.

VEAMOS EL EJEMPLO

ESC. 2

PG DE LA FAMILIA, NIÑOS JUGANDO, CORRIENDO POR LA CASA, LA ABUELA REGAÑÁNDOLOS, Y EL HIJO RECIENTE DIVORCIADO, SENTADO LEYENDO UNA REVISTA, ENAJENADO DE SU ENTORNO.

PP DE LA MADRE QUE LO OBSERVA

VIVO EN CON MI HIJA, MIS NIETOS Y SU ESPOSO. DESDE HACE UNOS MESES MI HIJO VINO A VIVIR CON NOSOTROS.

PREOCUPADA.

ESC. 3

PM DE HOMBRE EN EL BAÑO
PERFUMANDOSE DESPUES DE
AFEITARSE.

PP DE HOMBRE MIRANDOSE AL
ESPEJO.

PM DE HERMANA MIRANDOLO

LLEVABAN 19 AÑOS DE CASADOS.
AHORA EL Y SU ESPOSA SE ESTAN
DIVORCIANDO. EL LA ENGAÑÓ CON UNA
COMPAÑERA DE TRABAJO, ESA FUE LA
RAZON DE LA SEPARACION.

ESC. 4

PM DE HOMBRE SENTADO EN EL
SILLON TUMBADO HACIA ATRÁS
PERDIDO EN SUS PENSAMIENTOS.

PP DE ROSTRO

DESDE QUE VINO PARA CASA, LO NOTO
DESEQUILIBRADO. ESTA MUY DELGADO,
SIEMPRE DESCONCENTRADO, COMO SI
ESTUVIERA EN LAS NUBES Y APENAS
VISITA AL NIÑO.

ESC. 5

PM DE MADRE RECOGIENDO BOTELLAS
DE CERVEZA Y RON Y COLILLAS DE
CIGARRO DEL CUARTO DEL HIJO,
PREOCUPADA.

PP DE MADRE PREOCUPADA

CREO QUE ESTA ATRAVESANDO POR LA
LLAMADA CRISIS DE LOS 40, UNA ETAPA
DE AUTOREAFIRMACION EN EL HOMBRE,
DONDE CREEN QUE SE LES ACABA EL
TIEMPO Y DEBEN DISFRUTAR. BEBE
MUCHO, LO GASTA TODO EN BEBIDA Y
FIESTAS. ESTOY PREOCUPADA POR SU
SALUD.

ESC. 6

PM DE HOMBRE LEVANTANDOSE
SIN PODER MOVER EL CUELLO.

PP DE HOMBRE ADOLORIDO.

HACE UNOS DIAS DESPERTO CON
MUCHO DOLOR EN EL CUELLO POR UN
EJERCICIO QUE HIZO PORQUE COMENZO
DESDE HACE UNOS DIAS A PRACTICAR
DEPORTES PARA MANTENERSE EN FORMA.

ESC. 7

PM DE MUJER BUSCANDO EN EL
BOTIQUIN EL PARACETAMOL, LO
ENCUENTRA Y SALE.

SUPUSE QUE SE TRATABA DE UN DOLOR
MUSCULAR Y LE SUGERI QUE TOMARA 2
TABLETAS DE PARACETAMOL CADA 6
HORAS HASTA ALIVIARSE.

ESC. 8

PM DEL HIJO ADOLORIDO

PM DE MUJER QUE LLEGA AL CUARTO
CON LAS PASTILLAS PARA EL HIJO QUE
ESTA ADOLORIDO.

ESC. 9

PM DE MUJER PREPARANDO EL
DESAYUNO EN LA COCINA, ENTRA EL
HIJO Y LE DICE LO QUE SE SIENTE,
CONVERSAN SOBRE EL TEMA

PP DE HIJO

PP DE MADRE

ESC. 10

PM DEL HIJO ACOSTADO Y MUY
DECAIDO, LA MADRE LO OBSERVA
DESDE LA PUERTA SIN QUE EL LA
VAE.

ESC. 11

PM DE LA MADRE Y LA HERMANA QUE
CONVERSAN MIENTRAS VAN HACIA EL
CUARTO SOBRE LO QUE OCURRE.

PM DE HIJO EN EL CUARTO, ENTRAN
MADRE Y HERMANA, CONVERSAN Y LO
CONVENCEN PARA QUE VAYA AL
MEDICO

COMENZO A TOMAR LAS TABLETAS.
DESEABA SENTIRSE BIEN. ESA NOCHE
LO HABIAN INVITADO A UNA FIESTA Y
ESTABA ENTUSIASMADO CON
PARTICIPAR.

AL DIA SIGUIENTE DE LA FIESTA,
AMANECIO CON NAUSEAS Y VOMITOS.
CREI QUE ERAN LOS EFECTOS DE TANTA
BEBIDA INGERIDA EL DIA ANTERIOR Y NO
LE DI MUCHA IMPORTANCIA.

MIENTRAS AVANZABA EL DIA FUERON
APARECIENDO OTROS SINTOMAS, TENIA
DOLOR ABDOMINAL, MAREOS Y UN
DECAIMIENTO INTENSO

ESTAS DOLENCIAS SE AGUDIZABAN CADA
VEZ MAS. ESTABA ASUSTADO. ENTRE LA
HARMANA Y YO, LOGRAMOS
CONVENCERLO Y LO LLEVAMOS AL
CUERPO DE GUARDIA.

CONDUCTOR:

ESTE PACIENTE HA SUFRIDO LOS EFECTOS
DE LA INTERACCIÓN ENTRE EL

ESC. 12

INTERV. DR. PEREZ

PARACETAMOL Y EL ALCOHOL. EN ESTE CASO EL ALCOHOL INHIBIÓ LA DESTRUCCIÓN DEL PARACETAMOL EN EL HÍGADO LO CUAL PROVOCÓ UN AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN EN LA SANGRE DEL MISMO Y LA TOXICIDAD SOBRE LAS CÉLULAS DEL HÍGADO, CAUSANTE DE LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS DEL PACIENTE. PUDO HABER PROVOCADO UN DAÑO MAYOR Y MÁS PELIGROSO. SI ESTA TOMANDO MEDICAMENTOS NO INGIERA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CONSULTE A SU MÉDICO.