

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Dispensarización de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
en la atención primaria de salud en Cuba

1995-2009

Dr. Miguel Almaguer López
Dr. Raúl Herrera Valdés
Instituto de Nefrología
La Habana. Cuba.

Fuente de datos:
Ministerio de Salud Pública
Dirección Nacional de Estadísticas

Introducción

La dispensarización de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en la atención primaria de salud se inició por el Sistema Nacional de Salud de Cuba en el año 1995.

En 1996 se aprobó el Programa Nacional de Prevención de la Insuficiencia Renal Crónica por el Ministerio de Salud Pública .

El objetivo de la dispensarización de los pacientes con IRC en la atención primaria de salud es el diagnóstico temprano mediante la pesquisa activa de los grupos de riesgo identificados, evaluar los riesgos, prevenir la progresión y las complicaciones de la enfermedad, un tratamiento eficaz, rehabilitación y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además se dispone de un sistema de información útil para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones.

Prevalencia de pacientes dispensarizados por Insuficiencia Renal Crónica. Cuba. 1995-2009.


Años		Prevalencia		Años		Prevalencia	
	No.	Tasa x 1000 hab		No.	Tasa x 1000 hab		
1995	6121	0.5	2003	9925	0.8		
1996	6128	0.5	2004	9761	0.8		
1997	6813	0.6	2005	10313	0.9		
1998	6984	0.6	2006	11427	0.9		
1999	7435	0.6	2007	---	---		
2000	7963	0.7	2008	---	---		
2001	9811	0.8	2009	15488	1.4		
2002	10375	0.9					

No hay datos de los años 2007-2008

**Prevalencia de pacientes dispensarizados por Insuficiencia Renal Crónica.
Distribución por provincias. Cuba. 2009.**

Provincia	No.	Tasa x 1000 habitantes
CUBA	15488	1.4
Pinar del Río	848	1.2
La Habana	960	1.3
Ciudad Habana	3887	1.8
Matanzas	602	0.9
Villa Clara	612	0.8
Cienfuegos	713	1.8
Sancti Spiritus	442	1.0
Ciego de Avila	200	0.5
Camagüey	479	0.6
Tunas	422	0.8
Holguín	2620	2.5
Granma	1797	2.1
Stgo de Cuba	986	0.9
Guantánamo	534	1.0
Isla de la Juventud	386	4.5

Prevalencia de pacientes dispensarizados por Insuficiencia Renal Crónica. Distribución por provincias. Cuba. 2009.



**Prevalencia de pacientes dispensarizados por Insuficiencia Renal Crónica.
Distribución por provincias y sexo. Cuba. 2009.**

Provincias	Masculino		Femenino	
	No.	Tasa x 1000 hab.	No.	Tasa x 1000 hab.
Pinar del Río	477	1.3	371	1.0
La Habana	436	1.2	524	1.4
Ciudad Habana	1903	1.8	1984	1.8
Matanzas	305	0.9	297	0.9
Villa Clara	337	0.8	275	0.7
Cienfuegos	359	1.8	354	1.8
Sancti Spiritus	215	0.9	227	1.0
Ciego de Avila	112	0.5	88	0.4
Camagüey	226	0.6	253	0.7
Tunas	205	0.8	217	0.8
Holguín	1372	2.6	1248	2.4
Granma	905	2.1	892	2.2
Santiago de Cuba	456	0.9	530	1.0
Guantánamo	297	1.2	237	0.9
Isla de la Juventud	158	3.6	228	5.3
CUBA	7763	1.4	7725	1.4

Prevalencia de pacientes dispensarizados por Insuficiencia Renal

Crónica. Distribución según grupos de edades. Cuba. 2009.

Grupos de edades (años)	No.	Prevalencia x 1000 hab.
Menor 1	2	0.1
1-4	29	0.1
5-9	84	0.1
10-14	142	0.2
15-19	306	0.4
20-24	601	0.8
25-59	5990	1.0
60-64	3587	6.8
65 y más	4747	3.6

PREVALENCIA DE PACIENTES DISPENSARIZADOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRONICA SEGÚN GRUPOS DE EDADES. CUBA 1995-2009

Años	Prevalencia x 1000 habitantes según grupos de edades							
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-59	60-64	≥65
1995	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	2.2	1.6
2002	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.8	3.7	2.5
2003	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.7	4.2	2.6
2004	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	3.9	2.5
2005	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	3.9	2.6
2006	0.1	0.1	0.1	0.1	no datos	0.8	4.6	2.3
2009	0.1	0.1	0.1	0.2	no datos	1.0	6.8	3.6

La Dirección Nacional de Estadísticas a partir del año 2006 dividió el grupo de edad de 15-24 años en dos subgrupos 15 -19 años y 20-24 años como aparece en la tabla anterior.

COMENTARIOS

- **La dispensarización de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en la atención primaria de salud tiene una tendencia creciente cada año.**
- **Pero aún hay subregistro de los pacientes, al comparar los resultados con investigaciones epidemiológicas de base poblacional, más evidente en las provincias con una prevalencia inferior a 1.0 x 1000 habitantes.**
- **El Municipio Especial de la Isla de la Juventud tiene la prevalencia más elevada del país, y es debido a un programa de pesquisa activa de Enfermedad Renal Crónica, (Estudio ISYS).**
- **Hay una similar prevalencia para el sexo masculino y femenino.**
- **La prevalencia se incrementa en correspondencia con el envejecimiento de la población, la mayor y creciente prevalencia es en las edades de 60 años y más.**