COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

**Grupo de Investigación COVID-19 y riñón
Instituto de Nefrología "Dr. Abelardo Buch López"
La Habana. Cuba**

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

- **Antecedentes**
- **La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo**
- **Daño renal durante la fase activa de la COVID-19**
 - **Clínica**
 - **Histopatología**
 - **Etiopatogenia**
- **La Enfermedad Renal Crónica como posible secuela de la COVID-19**
- **Resultados preliminares de la investigación COVID-19: riesgo, daño y secuelas renales**

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

✓ **Antecedentes**

(B)

Wuhan. China. Diciembre, Año 2019

Virus SARS-CoV-2

(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)

Síndrome respiratorio de moderado a severo consecutivo a la infección

Neumopatía de Wuhan

COVID-19

El Mundo. Diciembre, Año 2020

Personas confirmadas
75.1 millones

Personas recuperadas
42.5 millones

Personas fallecidas
1.67 millón

Actualidad mundial

COVID-19

Enfermedad sistémica

Fase aguda

Estadios: asintomáticos - sintomáticos - graves - críticos - fallecidos

Complicaciones

- Pulmonares**
- Inmunológicas**
- Hematológicas**
- Neurológicas**
- Psicológicas**
- Cardiológicas**
- Renales**

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

- Antecedentes
- ✓ **La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo**

Carga global de enfermedad por ERC. Año 2017

Prevalencia	11.1%
ERC estadios 1-5	843.6 millones
Terapias de reemplazo	3.9 millones
Fallecidos	1.2 millones
Incremento de la mortalidad Años 1990-2017	41%

La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo

Año 2019

**4.37 millones de pacientes en
terapias de reemplazo renal**

Retos

- Transportación
- Acondicionamiento unidades de diálisis
- Equipamiento
- Personal especializado
- Unidades de aislamiento
- Disminución Tx renal
- Desarrollo de guías

La relación entre mortalidad y comorbilidades

Comorbilidades	OR (IC95%)
Enfermedad Cerebro Vascular	5,2 (1,5-18,2)
Insuficiencia Renal Crónica	5,2 (2,5-10,9)
Demencia	5,2 (2,7-12,6)
Cáncer	4,5 (2,3-8,7)
Obesidad	4,0 (1,7-9,2)
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	2,7 (1,4-5,4)
Cardiopatía Isquémica	2,6 (1,6-4,3)
Diabetes Mellitus	1,7 (1,1-2,6)
Hipertensión arterial	1,3 (0,9-1,8)
Asma Bronquial	0,6 (0,4-1,1)

Treatment of COVID-19 patients with the anti-CD6 antibody itolizumab

Table 4. Univariate logistic regression analysis

		Death Odds ratio	IC 95%	
Generals	Age (> 65)	1.680	0.601	4.697
	Time between symptoms and itolizumab (>7)	5.625	1.862	16.989
	Neurological symptoms	4.778	1.076	21.224
Comorbidities	Hypertension	0.613	0.220	1.709
	Diabetes mellitus	2.024	0.712	5.753
	Cardiovascular disease	1.813	0.644	5.102
	COPD	0.952	0.216	4.197
	Cancer	2.000	0.264	15.163
	Chronic renal disease	4.778	1.076	21.224
	Asthma	1.583	0.478	5.246
	Obesity	1.500	0.307	7.326
	Nutrition deficit	0.327	0.066	1.634
	Baseline laboratory biomarkers	AST (> 22.1 IU L ⁻¹)	10.500	2.462
D-dimer (> 1.35 µg mL ⁻¹)		6.857	1.124	41.827
ALC (> 7.60 × 10 ⁹ L ⁻¹)		4.978	1.610	15.387
Neutrophils (> 5.57 × 10 ⁹ L ⁻¹)		8.196	2.311	29.073
NLR (> 8.85)		26.444	5.788	120.819
PLR (> 146.2)		6.500	1.594	26.511
IL-6 (> 53.4 pg mL ⁻¹)		7.083	1.075	46.478

The highlighted variables are significantly associated with higher odds of death.

Pronóstico de mortalidad en pacientes con COVID-19

n: 333	Mortalidad
Ptes. sin daño renal	1.2%
Ptes. con daño renal	11.2%

Coronavirus e Inmunosenescencia

Respuesta inmune e hiperinflamación

La respuesta inmune puede depender del grado de inflamación sistémica previa

Inflamación aguda

Inflamación crónica: concepto

**La inflamación crónica es la presencia continuada,
en ocasiones durante muchos años,
de factores pro-inflamatorios a niveles superiores que los basales,
pero mucho más inferiores a aquellos que se encuentran
en la inflamación aguda.**

Inflamación crónica

Inflamación crónica

Inflamación crónica y enfermedades crónicas

Inflamación crónica, senectud y enfermedades vasculares crónicas

Enfermedad renal crónica y comorbilidades

Enfermedad renal crónica y comorbilidades

ERC avanzada
Anemia
Malnutrición
Deficiencia Vit. D
Inmunosupresión
Inmunosupresores

Enfermedad renal crónica y factores de riesgo tradicionales y no tradicionales

Enfermedad Renal Crónica

Factores de riesgo tradicionales

Edad
Blanco
HTA
LDL-HDL
DM
ECV
Estrés
Masculino
Tabaquismo
Sedentarismo
Menopausia
Factores genéticos

Factores de riesgo no tradicionales

Inflamación

Estrés oxidativo
Disfunción endotelial
Toxinas urémicas
Malnutrición
Proteinuria
Lip(a)apo(a)
AGES/ALEs
Anemia
Trombogénesis
Metabolismo P-Ca
Resistencia a la insulina
Homocisteinemia
Disb. hidroelectrolítico
Disb. acido-base
Factores genéticos ERC

Fuentes de estímulos inflamatorios propios de la ERC

Síndrome MIA

Marcadores de inflamación como predictores de mortalidad cardiovascular

Proteína C reactiva

Amiloide sérica A

Marcadores de inflamación como predictores de mortalidad general

Riesgo
relativo
de muerte
%

Proteína C reactiva

Riesgo
relativo
de muerte
%

Amiloide sérica A

Características de la senescencia celular

- Paro irreversible de la replicación
- Resistencia a la apoptosis
- Metabólicamente activas

Fenotipo secretor asociado a la senectud (SASP)

Secreción de mediadores de inflamación:

- citocinas, bradiquininas, prostanooides, quimocinas
- proteínas asociadas al daño del ARN
- radicales oxidantes (ROS)
- factores hemostáticos
- presores
- proteasas

Efectores

- Células
- Tejidos

Inflamación crónica

Enfermedades crónicas

Tejido adiposo

Órgano endocrino activo

Adipocinas

Leptina
Adiponectina
Resistina
Angiotensina II
TNF - α
PAI - 1

IL - 1 - 6 - 8 - 10
Prostaglandina
Prostaciclina
H G F
V E G F

Inflamación en la obesidad

Obesidad

Condición inflamatoria sub-clínica

Activación del sistema inmune innato

Producción factores pro-inflamatorios

TNF-alfa, IL-6, leptina, resistina

Disminución factores anti-inflamatorios

Adiponectina

Reclutamiento del sistema inmune adquirido

Resistencia a la insulina y diabetes

Guzmán-Flores JM et al. Células de la inmunidad innata y adaptativa en la diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Gaceta Médica de México. 2012;148:381-9

Richardson VR et al. Adipose tissue inflammation. Immunobiology. 2013;218:1497– 1504

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

- Antecedentes
- La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo
- ✓ **Daño renal durante la fase activa de la COVID-19**
 - **Clínica**
 - **Histopatología**
 - **Etiopatogenia**

Sepsis-associated acute kidney injury: is COVID-19 different?

Clínica

Kidney International (2020) 98, 1370–1372; <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.08.009>

- Los primeros reportes de COVID-19 plantearon la ausencia de daño renal en casos graves y críticos.
- A finales de marzo se hizo evidente que el FRA era muy frecuente en los casos severos
- A mediados de Abril, en los EUA, destacaban al fallo renal asociado a los casos de COVID-19 como una “segunda oleada”

La lesión renal durante la fase activa de la COVID-19

Estudios	No. Pacientes	Proteinuria %	Hematuria %	Creatinina elevada %	Fracaso renal agudo %
<p>R.P.China Incidence and risk factors of kidney impairment on patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis Qixin Yang, Xiyao Yang medRxiv preprint doi:https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20116400 June 3, 2020.</p>	n= 4 375	42.0	30.3	6.6	7.7
<p>EUA Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19 Hirsch J S, Jia H. Ng, et al. Kidney Int.2020 Jul [cited 2020 Aug 11];98(1):209–18</p>	n= 5 449	46.0	46.0	--	37.0
<p>España Chronic kidney disease and acute kidney injury in the COVID-19 Spanish outbreak Portolés J, Marques M, López-Sánchez P, et al Nephrol Dial Transplant (2020) 35: 1353–1361 doi: 10.1093/ndt/gfaa189</p>	n= 1 603	37.8	45.6	21.0	11.4

Brazilian Consortium for the Study on Renal Diseases Associated With COVID-19: A Multicentric Effort to Understand SARS-CoV-2-Related Nephropathy

Antonio Augusto Lima Tolxira Junior^{1,2,3}, Pracíli Diego Miranda de Moraes Neves^{4,5,6}

La lesión renal durante la fase activa de la COVID-19

Patrones morfológicos en riñones de pacientes con COVID-19

- **Infarto renal**
- **Glomerulopatía colapsante**
- **Nefritis túbulointersticial**
- **Lesión tubular aguda**
- **Pielonefritis aguda**
- **Rabdomiolisis**
- **Infiltrado linfocitario**
- **Glomerulosclerosis segmentaria y focal**
- **Microangiopatía trombótica**

La lesión renal durante la fase activa de la COVID-19

Histopatología

Microscopía óptica

- **Túbulos proximales**
 - Pérdida del borde en cepillo
 - Degeneración vacuolar
 - Dilatación tubular
 - Denudación del epitelio
 - Agregación de eritrocitos
 - Necrosis tubular aguda
- **Intersticio**
 - Infiltración de linfocitos
- **Glomérulo**
 - Obstrucción capilares glomerulares y peritubulares
 - Trombos de plaquetas y fibrina

Inmunohistoquímica

- Aumento del receptor ECA2
- Anticuerpos contra la nucleoproteína del SARS-CoV-2

Microscopía electrónica

- Efecto citopático directo de la replicación viral en las células tubulares y en los podocitos

Su H, Yang M, Wan C, Yi L, Fang Tang F, Zhu H, et al. Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China. *Kidney Int.* 2020 Jul 1 [cited 2020 Aug 11];98(1):219–27. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003>

Farkash EA, Wilson AM, Jentzen JM. Ultrastructural evidence for direct renal infection with SARS-CoV-2. *JASN* [Internet]. 2020 Aug [cited 2020 Aug 13];31(8):1683–7. Available at: <https://doi.org/10.1681/ASN.2020040432>

Microscopía Electrónica del SARS Cov-2 (70nm-160nm)

Pulmón, Hígado y Riñón

Detección a nivel ultraestructural de las alteraciones observadas en el Riñón

Se observa la presencia de una partícula similar a SARS Cov-2 en el glomérulo, se señala con flechas. Se detecta a mayor magnificación las partículas completas de SARS Cov-2. Barra= 100nm

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Expression of the SARS-CoV-2 cell receptor gene *ACE2* in a wide variety of human tissues

Meng-Yuan Li^{1,2}, Lin Li^{1,2}, Yue Zhang^{3,4,5} and Xiao-Sheng Wang^{1,2*}

Vía
sanguínea

Etiopatogenia: Tormenta de citocinas

Etiopatogenia: Otros factores contribuyentes al daño renal

Cambios hemodinámicos

Toxicidad por drogas

Rabdomiolisis

Trastornos de la coagulación

Hipoxia sistémica

Infecciones

Etiopatogenia: Sistema Renina Angiotensina

ACE and ACE2 in kidney disease

Sonoo Mizuri, Yasushi Ohashi

Etiopatogenia: Mecanismos integrados

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

- Antecedentes
- La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo
- Daño renal durante la fase activa de la COVID-19
 - Clínica
 - Histopatología
 - Etiopatogenia
- ✓ **La Enfermedad Renal Crónica como posible secuela de la COVID-19**

A public health perspective of aging: do hyper-inflammatory syndromes such as COVID-19, SARS, ARDS, cytokine storm syndrome, and post-ICU syndrome accelerate short- and long-term inflammaging?

Arsun Bektas^{1†}, Shepherd H. Schurman^{2†}, Claudio Franceschi^{3,4} and Luigi Ferrucci^{1*}

Preguntas clínicas

1. Cuáles serán las secuelas para los millones de personas que se han recuperado del estado hiperinflamatorio que ha caracterizado a la COVID-19 y en particular para los cientos de miles que estuvieron en estados grave y crítico?
2. Los sobrevivientes mantendrán un proceso inflamatorio interno con empeoramiento de las comorbilidades e incremento de la susceptibilidad para las enfermedades relativas a la edad?

Experiencias anteriores sugieren que este síndrome puede conducir a un estado crónico de inflamación sistémica subclínica como se ve en el envejecimiento (inmunosenescencia-inflammaging) que resulta en un incremento y empeoramiento de las condiciones relativas a la edad pero puede afectar a personas jóvenes

Actualidad mundial

COVID-19

Enfermedad sistémica

Fase aguda

Fase de latencia

Pacientes asintomáticos – sintomáticos – graves – críticos - fallecidos

Pacientes recuperados

Complicaciones

Secuelas

- Pulmonares
- Inmunológicas
- Hematológicas
- Neurológicas
- Psicológicas
- Cardiológicas
- Renales

La modelación matemática en la pandemia de COVID 19.Cuba

COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas

- Antecedentes
- La Enfermedad Renal Crónica como factor de riesgo
- Daño renal durante la fase activa de la COVID-19
 - Clínica
 - Histopatología
 - Etiopatogenia
- La Enfermedad Renal Crónica como posible secuela de la COVID-19
- ✓ **Resultados preliminares de la investigación COVID-19: riesgo, daño y secuelas renales**

Investigación COVID-19 y riñón: riesgo, daño y secuelas de daño renal

Resultados preliminares

Objetivos

Fase 1: Estudio del daño renal durante el período de ingreso hospitalario por COVID-19 (H.C.Q.D. Salvador Allende)

Fase 2. Estudio del daño renal como secuela a los 6 meses y al año del alta hospitalaria (Instituto de Nefrología)

Metodología Fase 2

Universo de estudio en la fase actual 213 pacientes del Hospital Salvador Allende					
Asintomáticos	Sintomáticos	Graves	Críticos	Fallecidos	Total
85	88	20	7	13	213
Pacientes estudiados					
44	31	12	4	10	101

Investigación COVID-19 y riñón: daño y secuelas renales

Resultados preliminares

Metodología Fase 2. Variables					
Historia Clínica / Ultrasonido renal / Orina/ Hemoquímica / Hematología / Pruebas funcionales renales/ Histopatología					
Mediciones de Laboratorio		Fruebas funcionales renales		Biopsias renales. Necropsias	
Orina	Sangre	Hematuria	Glomérulos	Microscopía óptica	
Cituria	Hemograma	Leucocituria	Túbulos	Inmunofluorescencia	
Cultivo	Creatinina	Cilindruria	Intersticio	Inmunohistoquímica	
Dismorfia	TFG	Cristaluria	Vasos sanguíneos	Microscopía Electrónica	
IAC	Ácido úrico	Aminoaciduria			
RPC	Fosfato	Acidosis tubular			
Glucosa	Glucosa	Glucosuria			
Cistina	Bicarbonato	ITU			
Na	Na	Fracción de excreción de Na			
K	K	Fracción de excreción de K			
Ca	Ca	Fracción de excreción de P			
pH	pH	Fracción de excreción de AU			

La Enfermedad Renal Crónica como posible secuela de la COVID-19

- **Es probable que las lesiones renales adquiridas durante la fase aguda de la enfermedad, potencializada por la inflamación crónica persistente puedan progresar de forma lenta y asintomática hacia estados avanzados de la ERC.**
- **Dada la cuantía de casos de COVID-19 a nivel mundial se predice la posibilidad que millones de personas puedan requerir de diálisis y/o trasplante renal**

Interrogantes

- 1. Cuál será la magnitud de la carga para los seres humanos ?**
- 2. Podrán soportar los sistemas de salud el incremento de capacidades para terapias de reemplazo de la función renal ?**
- 3. Asistiremos a una pandemia de ERC subsiguiente a la pandemia de COVID-19?**

Muchas gracias

Participantes

Instituto de Nefrología "Dr. Abelardo Buch López"

Diseño y coordinación

Raúl herrera Valdés

Guillermo Guerra Bustillo

Miguel Almaguer López

Yamile García Villar

Laboratorio Clínico

Yanetsy Córdoba Rodríguez

Tania Hernández Rego

Anabel Ibarra Chardonier

Aleida García Pérez

Fisiopatología

Raymed Bacallao Méndez

Magalys Smith González

Niurka Diéguez Martínez

Inés Roig Duarte

Anatomía Patológica

Laura López Marín

Leticia Rodríguez Leyva

Yudit Chávez Muñoz

Yadira Iduate Feble

Epidemiología

Irene Fiterre Lancís

Nefrología Clínica

Jorge F. Pérez-Oliva

Betsy Llerena Ferrer

Aymara Badell

Bioestadística

Carlos A. Rodríguez García

Jorge Bacallao Gallestey

Imagenología

Niurka Mesa Dueñas

Apoyo

Raquel Pérez Campos

Milka Berenguer

Irene Blanco González

Lubiana Vázquez La O

Diana Gutiérrez Oquendo

Elizabeth Ayala Ávila

Elizabeth Gutiérrez Quintana

Sajay Nicado Díaz

Silvia Capote Noa

Dailín Jerez Hernández

Raciel Pérez Decade

H.C.Q.D. "Dr. Salvador Allende"

Dra. Mylene Vázquez Martínez.

Dr. José Rego Hernández,

Dra. Alina Pérez Falcón,

Dra. Amarilis Platero Díaz,

Dra. Yordanka Piña Pompa.

Atención Primaria de Salud de La Habana

Dirección General de Transporte de La Habana