ISSN 1028-4346

SEI SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

SEI No. 28, 2019 *16 de julio*

CENTRO DE DIRECCIÓN MINISTERIAL MINSAP

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Plaza, La Habana, Cuba.
Código Postal: 10 400.

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

En este número:

América (La OPS no ha actualizado datos de zika y chikungunya desde 2017).

⇒ ***Zika:*** hasta diciembre de 2017 se reportaron 583 451 casos sospechosos en la región, confirmados 223 477 y 3720 casos de microcefalia, 20 fallecidos y 6329 importados.

⇒ ***Chikungunya:*** hasta el 22 de diciembre de 2017 se reportaron 61 613 casos sospechosos, 123 087 confirmados, 101 fallecidos y 107 casos importados.

⇒ ***Dengue:*** La Organización Panamericana de la Salud reporta **1 316 984 casos de dengue en las Américas** hasta el 16 de julio de 2019. Sobresale **Brasil con 1 127 244 (85,6%) casos**. Han fallecido 510 personas en 2019.

⇒ ***Fiebre amarilla:*** Tres países de la Región (Bolivia, Brasil y Perú) notificaron casos confirmados de fiebre amarilla que ocurrieron entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. En Brasil, hasta el 4 de junio de 2019, se reportaron 1281 casos humanos notificados, de ellos 82 se confirmaron y 14 fallecieron. Además, se notificaron 1240 casos no humanos, de ellos se confirmaron 48.

Cuba

Intercambian en Holguín sobre resultados del tratamiento de un tipo de cáncer de piel
Recibe Cuba distinción de la ONU por logros en el sistema de salud pública
Profesionales más sensibles, abnegados y necesarias de nuestro sistema nacional de salud

El mundo

Situación del ébola en la República Democrática del Congo
Virus del Ébola en Uganda
Actualización Epidemiológica de dengue en las Américas
Alerta epidemiológica de rubéola en las Américas
Actualización Epidemiológica de sarampión en las Américas
Actualización epidemiológica de influenza
Dengue, virus del Zika y chikungunya en Bolivia
Dengue, virus del Zika y chikungunya en Colombia
Dengue, virus del Zika y chikungunya en El Salvador
Dengue, virus del Zika y chikungunya en Guatemala
Dengue, virus del Zika y chikungunya en México
Dengue en Panamá
Malaria en Colombia
Malaria en México
Sarampión en Colombia
Sarampión en Estados Unidos
Cólera en Haití

Noticias

Eliminan VIH de genes de varios ratones mediante técnicas combinadas
Descubren el mecanismo que vuelve a los niños más susceptibles a la sepsis

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

- **Virus del Zika en las Américas/ Organización Panamericana de la Salud**

Casos acumulados de zika actualizados desde 2015-2017 con cierre 4 de enero de 2018. Se reportaron **583 451 casos sospechosos** en la región, **confirmados 223 477** y **3720 casos de microcefalia asociado al virus**, **20 fallecidos y 6329 casos importados**.

Brasil se mantenía con el 39,7% (231 725) de los sospechosos reportados en la región, el 61.4% (137 288) de los confirmados, el 55% (11) de los fallecidos y el 79,3% (2952) de los Síndromes Congénitos confirmados asociados al virus del Zika.

Se mantenía en **48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika** y en 5 el número de países que notificaron casos de zika transmitidos sexualmente. Desde la semana epidemiológica 44 de 2016 ningún nuevo país/ territorio de las Américas confirmó transmisión autóctona vectorial de Zika.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud/ Zika

Resumen Global

84 países y territorios reportaron evidencia de transmisión del virus del Zika transmitida por mosquitos en el mundo desde el año 2007 al 2017.

- **Síndrome Congénito asociado al virus del Zika**

De los 34 países y territorios con Síndrome Congénito asociado al virus del Zika, el 79,4% (27) pertenecen a la región de las Américas.

Fuente: Actualización epidemiológica de la OPS, casos acumulados del 4 de enero de 2018

- **Virus de Chikungunya en las Américas/ Organización Panamericana de la Salud**

Los casos acumulados de chikungunya corresponden al año 2017, actualizados hasta el 22 de diciembre, última actualización de la OPS.

El mayor reporte de casos ocurrió en la subregión del Cono Sur a expensas de Brasil con el **98,9% de los confirmados** del total de 121 734 y el **81,5% de los sospechosos** de la región para un total de 50 196 casos.

En resumen se reportaron en la región un total de 61 613 casos sospechosos, 123 087 confirmados, 101 fallecidos y 107 casos importados.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud/ Chikungunya

Nota: A pesar, de que la información de zika y chikungunya, permanece desactualizada en la web de la OPS, puede encontrar información actualizada de 2019 en nuestra web: https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

♦ Resumen semanal de dengue

La Organización Panamericana de la Salud reporta **1 316 984 casos de dengue en las Américas** hasta el 16 de julio de 2019. Sobresale **Brasil con 1 127 244 (85,6%) casos**, seguido de Colombia con 52 064, Nicaragua con 36 390 y México con 27 259 casos.

Países	Casos		Países	Casos
Brasil	1127244		Martinica	430
Colombia	57910		Guadalupe	192
Nicaragua	39390		Antigua y Barbuda	182
México	27259		Estados Unidos	129
Honduras	18988		Trinidad y Tobago	106
Perú	6387		Aruba	59
El Salvador	5688		Granada	46
Guatemala	5610		Suriname	33
Venezuela	4654		San Martín	20
Bolivia	4560		Dominica	11
Jamaica	3696		Santa Lucía	7
Rep. Dominicana	3433		Isla Vírgenes (UK)	7
Paraguay	3058		San Vicente y las Granadinas	5
Argentina	2315		Guyana	4
Costa Rica	1975		Barbados	2
Ecuador	1910		Bermuda	1
Panamá	1025		Puerto Rico	1
Belice	647			
Total				**1 316 984**

Figura 1. Distribución geográfica del dengue en las Américas el 16 de julio de 2019.



Se reportaron 510 **(+13) fallecidos** (Brasil 366, Honduras 48, Colombia 24, México 15, Perú 13, Guatemala 12, Venezuela 8, Bolivia 7, Nicaragua 5, Jamaica y Paraguay y República Dominicana 3 cada uno, Panamá 2 y Ecuador 1.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud

♦ Actualización epidemiológica de fiebre amarilla en las Américas, 6 de marzo de 2019

En 2018, fueron 5 los países y territorios de la región de las Américas que notificaron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa y Perú, mientras que en 2019, tres países de la Región (Bolivia, Brasil y Perú) notificaron casos confirmados de fiebre amarilla que ocurrieron entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

Fuente: Actualización Epidemiológica de fiebre amarilla en las Américas

♦ Fiebre amarilla en Brasil, 4 de junio de 2019

En el presente periodo estacional (2018-2019) se notificaron 1281 casos humanos, de ellos se confirmaron 82 y fallecieron 14. Permanecen 286 en investigación y 913 fueron descartados. Además, se notificaron 1240 casos no humanos, de ellos se confirmaron 48, permanecen 321 en investigación, 435 se clasificaron como indeterminados y 436 fueron descartados.



Aunque la vigilancia de la fiebre amarilla actualmente se basa en la estacionalidad de la enfermedad, cuyo período se extiende entre noviembre y mayo, con monitoreo por el Ministerio de Salud entre los meses de julio/2018 a junio/2019, a partir del informe nº 11, se describen los registros para el año 2019. Los datos de los meses anteriores, de los brotes recientes e históricos, obtenidos en: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissaoeprevencao#epidemiologia.

Vigilancia de Casos Humanos

Se registraron casos humanos confirmados en los estados São Paulo (68), Paraná (13) y Santa Catarina (1). La mayoría de los casos eran trabajadores rurales y / o en el área silvestre, de ellos 73 (89%) del sexo masculino, con edades entre 8 y 87 años. En marzo/2019 (SE 13), se confirmó el primer caso de fiebre amarilla en el estado Santa Catarina. Entre los casos confirmados, 14 fallecieron (17,1%). El número total de casos humanos registrados en el mismo período de 2018 fue de 1309.

Vigilancia de epizootias en Primates no Humanos - PNH (monos)

Se registraron epizootias de PNH confirmadas en São Paulo (13), Río de Janeiro (1), Paraná (32), Pará (1) y Santa Catarina (1) con mayor número de epidemias confirmados en la región Sudeste (68,7%; 33/48), aunque actualmente la transmisión está avanzando en la región Sur, principalmente en Paraná.

Áreas de riesgo

Ante este escenario, es fundamental que los municipios de las áreas de riesgo amplíen las coberturas vacunales (al menos el 95% de cobertura), con el objetivo de garantizar la protección de la población contra la enfermedad, reduciendo el riesgo de muertes y brotes, además del riesgo de reurbanización de la transmisión (por Aedes aegypti). La vacunación está recomendada para todo el Área con Recomendación de Vacuna (ACRV). Se resalta que el mayor riesgo está en las áreas consideradas afectadas y ampliadas, donde la transmisión fue documentada recientemente (2018/2019). Las personas no vacunadas y expuestas en esas localidades deben ser vacunadas, prioritariamente.

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil

RESUMEN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

Actualización Epidemiológica de sarampión en las Américas, 18 de junio de 2019

Desde el 1 de enero al 18 de junio de 2019 se notificaron 1722 casos confirmados de sarampión en 13 países de la Región de las Américas: Argentina (5 casos), las Bahamas (1 caso), Brasil (122 casos), Canadá (65 casos), Chile (4 casos), Colombia (125 casos), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso importado), Estados Unidos de América (1044 casos), México (2 casos), Perú (2 casos), Uruguay (9 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (332 casos). En este mismo periodo no hubo reporte de defunciones.

Desde la Actualización Epidemiológica de sarampión publicada el 17 de mayo, siete países han notificado casos confirmados de sarampión adicionales: Argentina (1 caso), Brasil (49 casos), Canadá (20 casos), Colombia (16 casos), Cuba (1 caso importado), Estados Unidos de América (205 casos), y la República Bolivariana de Venezuela (129 casos).

En 2019, son tres los países (Brasil, Colombia y Venezuela) que siguen notificando casos relacionados con el genotipo D8 linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11 cuya circulación había sido detectada por primera vez en Venezuela en 2017. Mientras que en 2018 la mayor proporción de casos de la Región de las Américas se registró en Brasil y Venezuela; en 2019 la mayor proporción proviene de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Brasil.

El caso notificado de Cuba fue un caso importado de sarampión confirmado por laboratorio. El caso es una mujer de 31 años de edad, residente de Australia, con antecedente de viaje a la ciudad de Bogotá y la Isla de San Andrés, Colombia. El caso no tenía antecedente de vacunación contra sarampión e inició exantema el 20 de mayo de 2019. El genotipo viral identificado en este caso es D8.

Orientaciones para las autoridades nacionales

Ante las continuas importaciones del virus desde otras regiones del mundo y los brotes en curso en países de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) refuerza las recomendaciones realizadas desde febrero de 2015 a todos los Estados Miembros respecto a:

- Vacunar para **mantener coberturas homogéneas del 95%** con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis, en todos los municipios.
- **Vacunar a poblaciones en riesgo**, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como personal de salud, personas que trabajan en turismo y transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos, medios de transporte masivo urbano y otros), así como viajeros internacionales.
- **Mantener una reserva de vacuna** sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéolaparotiditis (SRP), **y jeringas/insumos** para acciones de prevención y control ante casos importados.
- **Identificar los flujos migratorios** externos (llegada de personas extranjeras o personas del mismo país que realizan actividad temporal en países con brotes en curso) e internos (desplazamientos de grupos poblacionales) dentro de cada país, incluyendo las poblaciones indígenas u otro grupo poblacional vulnerable, para facilitar el acceso a los servicios de vacunación, según el esquema nacional.
- Implementar un **plan para inmunizar a la población migrante** en las fronteras de alto tránsito, priorizando la población en riesgo, tanto migrante como residente en los municipios que albergan a estos grupos de población.
- **Incrementar las coberturas vacunales** a fin incrementar la inmunidad poblacional.
- **Fortalecer la vigilancia epidemiológica** de sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos en los servicios de salud públicos, privados y de seguridad social, para contener el riesgo mediante las acciones de salud pública oportunas y asegurar de que las muestras se reciban en el laboratorio dentro de los 5 días después de haberse recolectado la muestra y que los resultados de laboratorio estén disponibles oportunamente.
- Fortalecer la **vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras** para detectar y responder rápidamente frente a casos altamente sospechosos de sarampión.
- Brindar una **respuesta rápida** frente a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica, a través de la activación de los grupos de respuesta rápida entrenados con este fin, e implementando protocolos nacionales de respuesta rápida frente a los casos importados. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una coordinación permanente entre el nivel nacional, subnacional y local con canales de comunicación permanentes y fluidos entre todos los niveles (nacional, subnacional y local).
- En situación de brote, se debe **establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos** para evitar la transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia de pacientes a salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados por otras causas.

Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo viajero de 6 meses de edad en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad, que **reciba la vacuna contra el sarampión y la rubéola**, preferiblemente la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis - SRP), **al menos dos semanas antes de viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de sarampión.** Las recomendaciones de la OPS/OMS con relación a consejos para los viajeros, se encuentran disponibles en la Actualización Epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 27 de octubre de 2017.

Más detalles sobre los países en: Organización Panamericana de la Salud

RESUMEN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

Actualización Epidemiológica de rubéola en las Américas, 21 de junio de 2019

Ante el riesgo de importación y reintroducción del virus de la rubéola en la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud insta a los Estados Miembros a reforzar la vigilancia, intensificar las actividades de vacunación para lograr niveles de cobertura superiores al 95% en todos los menores de 5 años y a responder rápidamente a los casos importados.

Rubéola: es una enfermedad viral aguda, generalmente leve que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes susceptibles y es considerada de importancia en salud pública debido al potencial teratogénico del virus. Es causada por el virus de la rubéola, que pertenece al género *Rubivirus* (familia *Togavirus)*. Se transmite por contacto con secreciones nasofaríngeas de las personas infectadas (gotículas en el aire, cuando las personas infectadas estornudan o tosen). La infección en las mujeres embarazadas puede causar aborto involuntario, muerte fetal, o defectos congénitos en la forma de síndrome de rubéola congénita (SRC). El periodo de incubación se ha descrito que varía entre 14 a 21 días.
Clínicamente, en los primeros días presenta un cuadro febril inespecífico caracterizado por fiebre, cefalea, malestar general, coriza leve y conjuntivitis. La linfadenopatía retroauricular, occipital, y cervical posterior es el signo más característico, y se presenta 5 a 10 días antes del exantema. Se caracteriza por un exantema maculopapuloso y puntiforme difuso. Un porcentaje importante de las infecciones se complican con artralgia y artritis, particularmente en mujeres adultas. Se observa encefalitis en 1 de cada 6000 casos, más a menudo en adultos. Hasta el 50% de las infecciones por rubéola no muestran exantema o son subclínicas.

Resumen de la situación en las Américas

Durante 2009, en la Región de las Américas, se reportaron los últimos casos endémicos de rubéola en Argentina y Brasil. El mismo año, Canadá y Estados Unidos reportaron casos de rubéola importados y asociados a importación.
Entre 2010 y 2019 se notificaron 84 casos confirmados de rubéola en ocho países de la Región de las Américas mientras que en el mismo periodo se reportaron 16 casos de síndrome de rubéola congénita, tres en Canadá (uno en 2011, uno en 2015 y otro en 2018) y 13 casos en los Estados Unidos (tres en 2012; tres, uno cada año, entre 2013 y 2015; dos en 2016 y 5 en 2017). Todos importados o relacionados a importación.
En 2015, la Región de las Américas fue la primera Región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ser declarada libre de la transmisión endémica del virus de la rubéola, por el Comité Internacional de Expertos (CIE) de Documentación y Verificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y el síndrome de rubéola congénita en las Américas. Sin embargo, los retos para mantener a la Región libre de rubéola continúan, debido al riesgo permanente de importación y reintroducción del virus.
En 2016, se reportaron 2 casos confirmados de rubéola importados, uno en Canadá y otro en Estados Unidos. No se reportaron casos confirmados de síndrome de rubéola congénita.
En 2017, se reportaron 8 casos confirmados de rubéola importados, un caso en México y 7 casos en Estados Unidos. Adicionalmente se reportaron dos casos confirmados de síndrome de rubéola congénita en Estados Unidos.
En 2018, se reportaron 4 casos confirmados de rubéola asociados a importación, 2 casos en México y 2 casos en Estados Unidos. Adicionalmente se reportó un caso confirmado de síndrome de rubéola congénita en Canadá.

En 2019, Argentina y Chile notificaron casos confirmados. Argentina notificó 3 casos confirmados de rubéola. El primer caso fue clasificado como importado, corresponde a un hombre extranjero de 27 años, residente en la provincia de Córdoba desde hace 3 años, con antecedente vacunal desconocido. Inició exantema el 19 de abril y tuvo antecedente de viaje a la provincia de Fujian, de la República Popular de China, de donde regresó el 9 de abril. El genotipo viral identificado fue 1E. El segundo y tercer caso corresponden a dos hermanos de 7 y 11 años, argentinos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de vacunación ni de viajes. Iniciaron exantema el 8 y 16 de mayo, respectivamente. La fuente probable de infección de estos casos fue un contacto familiar con antecedente de viaje a la India. El último caso autóctono confirmado de rubéola en Argentina se registró en la provincia de Buenos Aires en 2009 y el genotipo identificado fue el 2B. Chile notificó un caso confirmado de rubéola importado. El caso corresponde a una mujer de 34 años procedente de la India, que reside en la ciudad de Santiago desde hace 5 años, con antecedente vacunal desconocido. Inició exantema el 6 de abril y tuvo antecedente de viaje a la India, con regreso el 26 de marzo.
Orientaciones para las autoridades nacionales

Ante el riesgo de importación y reintroducción del virus de la rubéola en la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros a:

- Redoblar esfuerzos para implementar el "**Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en las Américas 2018-2023",** en sus 4 líneas estratégicas: 1)garantizar el acceso universal a los servicios de vacunación; 2)fortalecer la capacidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica de sarampión, rubéola, y el síndrome de rubéola congénita; 3) desarrollar la capacidad nacional y operativa para mantener el estado de eliminación; 4) establecer mecanismos estándares para brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión, rubéola, y el síndrome de rubéola congénita para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica en los países (4).
- **Mantener coberturas homogéneas del 95%** con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis, en todos los municipios.
- **Vacunar a poblaciones en riesgo**, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como personal de salud, personas que trabajan en turismo y transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos, medios de transporte masivo, y otros), así como a viajeros internacionales.
- **Mantener una reserva de vacuna** sarampión-rubéola (SR) y/o sarampión-rubéola-parotiditis (SRP), **y jeringas/insumos** para acciones

Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que se aconseje a todo viajero de 6 meses de edad en adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad, que **reciba la vacuna contra el sarampión y la rubéola**, preferiblemente la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis - SRP), **al menos dos semanas antes de viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de sarampión y rubéola.** Las recomendaciones de la OPS/OMS con relación a consejos para los viajeros, se encuentran disponibles en la Actualización Epidemiológica publicada por la OPS/OMS el 27 de octubre de 2017.

Leer informe completo con otras recomendaciones en: Organización Panamericana de la Salud

RESUMEN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

Alerta Epidemiológica de dengue en las Américas, 25 de junio de 2019

Resumen de la situación

En la Región de las Américas, entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la 22 de 2019 se notificaron 1 191 815 casos de dengue (118,5 casos por 100 000 habitantes), de los cuales 546 589 casos (46%) fueron confirmados por criterios de laboratorio. Del total de casos notificados, 5599 (0,47%) fueron clasificados como dengue grave y la letalidad reportada fue de 0,02%.

El número de casos reportados en este periodo (SE 1 a 22 de 2019) fue superior al total registrado en 2017 y 2018, pero inferior al histórico reportado entre el 2015 y el 2016. La proporción de casos de dengue grave registrado en lo que va de 2019, es superior a lo reportado en 2016-2017, pero inferior al histórico reportado en el periodo 2006-2015.

Después de un periodo de casi dos años con baja transmisión de dengue, desde finales de 2018 e inicios de 2019 se observa una tendencia creciente tanto en el número de casos de dengue reportados, como en el número de casos de dengue grave.

Aunque la letalidad por dengue reportada en la Región, entre la SE 1 y la 22 de 2019, es la más baja en los últimos 10 años, se observa un aumento de esta en los menores de 15 años y adultos de 75 y más años en Brasil, siendo el serotipo predominante DENV 2.

Actualmente, en la Región de las Américas circulan simultáneamente los 4 serotipos de dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4), lo cual incrementa el riesgo de aparición de casos graves, con la consecuente carga en la atención para los servicios de salud. Durante el 2019, dos países reportaron la circulación de los 4 serotipos (Guatemala y México) y 4 países reportaron la circulación de 3 serotipos [Colombia (DENV 1, DENV 2 y DENV 3), Paraguay (DENV 1, DENV 2 y DENV 4), Perú (DENV 2, DENV 3 y DENV 4) y Venezuela (DENV 1, DENV 2 y DENV 3)].

Brasil, Colombia y Honduras, que suman el 93% del total de casos reportados en la Región de las Américas, notificaron un incremento en el número de casos en comparación con el mismo periodo del 2018.

Los cuatro países con mayor incidencia de casos reportados hasta la SE 22 de 2019 fueron Brasil, Nicaragua, Colombia y Honduras. Brasil, es el país de la Región con la mayor incidencia reportada (505,5 por 100 000 habitantes), con una tasa de letalidad de 0,03%. Nicaragua, registró una tasa incidencia de 441,9 por 100 000 habitantes, pero reportó una de las tasas de letalidad más baja en la Región. Por su parte, Colombia, que está tercero en la lista de países con mayor incidencia, reportó un aumento de casos desde la SE 42 de 2018, y se encuentra en la zona de epidemia del canal endémico a partir de la SE 8 de 2019, con una tasa de letalidad de 0,04%. Honduras, que ocupa el cuarto lugar entre los cuatro países con mayor incidencia, reportó un aumento sostenido de casos desde la SE 44 de 2018, y se encuentra en la zona de epidemia del canal endémico, con una tasa de letalidad de 0,3% que es la mayor registrada en la Región en lo que va de 2019.

Orientaciones para los Estados Miembros

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud reitera a los Estados Miembros las recomendaciones realizadas en la Alerta Epidemiológica del 21 de noviembre del 20183 y en la Actualización Epidemiológica del 22 de febrero de 20194.

A continuación, un resumen de las principales recomendaciones en relación con la preparación y respuesta a brotes, atención al paciente, diagnóstico por laboratorio, comunicación de riesgo y manejo integrado de vectores.

Preparación y respuesta a brotes

Como parte de la preparación y respuesta a brotes se recomienda a los Estados Miembros que:

• intensifiquen la vigilancia de la enfermedad, incluyendo el diagnóstico de laboratorio,
• revisen sus planes de emergencia,
• fortalezcan e intensifiquen la vigilancia y control de vectores,
• aseguren que los profesionales de atención de salud estén debidamente capacitados para el adecuado diagnóstico y manejo clínico de pacientes con arbovirosis, **con especial atención a los grupos de edad y grupos de riesgo que presenten la mayor tasa de letalidad**.
• involucren a la comunidad en las actividades de prevención y control,
• garanticen el monitoreo y sistematización del desempeño de la respuesta en cada brote, incluido el establecimiento de sala de situación, y
• adapten la comunicación de riesgo de acuerdo con el escenario epidemiológico.

En los países con presencia de vectores, pero sin virus circulante, los planes de preparación y respuesta deben centrarse en estrategias para disminuir los riesgos de transmisión. Se debe realizar la investigación rápida de todo caso con sospecha clínica y buscar la confirmación de laboratorio sobre la presencia del virus del dengue.

Sala de Situación

La sala de situación de salud es una herramienta fundamental que favorece el uso de la información para la toma de decisiones. En la misma se analiza la información mediante el trabajo multidisciplinario para apoyar la gestión en salud. Tiene un rol clave en la respuesta a situaciones de brotes y emergencias. En el caso del dengue la sala de situación es regularmente el escenario donde se da seguimiento a los aspectos claves de la respuesta intersectorial, confluyendo en ella la información de todos los sectores involucrados. Las actividades para realizar en la sala de situación incluyen, pero no se limitan a:

• Análisis y evaluación sistemática continua de la situación actual y prospectiva.
• Integración de la información epidemiológica, incluido el diagnóstico de laboratorios, control de vectores y manejo del paciente. Con el objetivo de: detectar tempranamente casos y brotes, monitorear tendencias e incidencia, conocer la dinámica de la circulación viral.
• Orientar y mantener el mecanismo de recolección de datos, incluido el control de calidad de los datos.
• Monitoreo las acciones e impacto de las medidas de intervención.
• Producción periódica y concisa de informes de situación operativos destinados a apoyar la coordinación de la respuesta a la emergencia o brote.

El Informe de situación debe: proporcionar una visión instantánea de las necesidades actuales, de la respuesta y las brechas en el brote o la emergencia; ser una herramienta de movilización de recursos; manejar los aspectos claves de la logística en la respuesta de prevención y control que está en curso.

Leer informe completo relacionado con la atención al paciente con dengue, diagnóstico por laboratorio, comunicación de riesgo, manejo integrado de vectores y medidas de prevención personal en: Organización Panamericana de la Salud

RESUMEN DE OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

Brote de la enfermedad por virus del Ébola en República Democrática del Congo

Hasta el 14 de julio de 2019, se reportó un total de 2501 casos de EVE, incluidos 2407 confirmados y 94 probables. En los últimos 21 días (del 23 de junio al 13 de julio de 2019), veintiuna zonas de salud han reportado al menos un caso confirmado, con un nuevo caso confirmado reportado en la zona de salud Mambasa. Hasta la fecha, los casos confirmados se han informado de 23 zonas de salud: Alimbongo (4), Beni (463), Biena (15), Butembo (255), Kalunguta (127), Katwa (619), Kayna (9), Kyondo (22), Lubero (28), Mabalako (346), Manguredjipa (19), Masereka (47), Musienene (71), Mutwanga (10), Oicha (44) y Vuhovi (90) en la provincia Kivu del Norte; y Mambasa (1), Ariwara (1), Bunia (4), Komanda (31), Rwampara (8), Mandima (178), Nyankunde (1) y Tchomia (2) en la provincia Ituri.
Se registró un total de 1665 muertes, incluyendo 1571 entre los casos confirmados, resultando en una tasa de letalidad entre los casos confirmados de 66% (1571/2395). El número acumulado de trabajadores de la salud aumentó a 136, con dos trabajadores de salud entre los nuevos casos confirmados, uno en Beni y uno en Mabalako.
Al 13 de julio de 2019, Beni y Mabalako son las principales áreas activas en el brote, con 46% (116/250) y 18% (44/250) de nuevos casos confirmados en los últimos 21 días, respectivamente. Doce zonas de salud, Mabalako, Beni, Butembo, Kalunguta, Katwa, Mambasa, Oicha, Kayna y Vuhovi han reportado nuevos casos confirmados en los últimos tres días y siguen siendo puntos de atención.
El rastreo de contactos está en curso en 23 zonas de salud. Un total de 19 118 contactos fueron registrados el 13 de julio de 2019, de los cuales 16 464 se habían visto en los últimos 24 horas (86%; varía entre 73-100% entre las zonas informantes). Las alertas en las dos provincias afectadas continuaron siendo elevadas e investigadas. De 1411 alertas procesadas (de las cuales 1531 eran nuevas) en las zonas sanitarias informantes al 13 de julio de 2019, se investigaron 1512 y se validaron 339 (22%) como casos sospechosos.
Los incidentes de inseguridad continúan, con dos proveedores de respuesta en Beni asesinados en sus hogares la noche del 13 al 14 de julio de 2019 en el área de salud de Mukulia, con frontera con Butembo.

Acciones de Salud Pública

- Goma ha pasado los últimos seis meses preparando la respuesta a la EVE, con anticipación al evento actual, con un CTE, apoyado por el Ministerio de Salud y Médicos Sin Fronteras operativo en la ciudad desde febrero de 2019, que es donde se trata el caso actual.
- Se estableció un mecanismo de coordinación reforzado en Butembo. Continúan las actividades de vigilancia, incluidas las investigaciones de casos, la búsqueda activa en centros de salud y comunidades, así como la identificación y listado de contactos en torno a los últimos casos confirmados. La colaboración entre las autoridades de salud en la República Democrática del Congo y Uganda continúa con el monitoreo de los contactos desplazados.
- Hasta el 13 de julio de 2019, un total acumulado de 161 400 personas han sido vacunadas desde el inicio del brote en agosto de 2018.
- La supervisión en puntos de entrada / puntos de control (PoE / PoC) continúa, con más de 74 millones de evaluaciones hasta la fecha. Un total de 76/85 (91%) PoE / PoC estaban operativos el 13 de julio de 2019.
- Continúan las actividades de reintegración comunitaria para los pacientes dados de alta de los Centros de Tratamiento de Ébola (CTE), junto con sesiones de psicoeducación para fortalecer el compromiso y la colaboración de la comunidad en la respuesta. Equipos de psicólogos continúan las negociaciones para resolver la renuencia a participan en acciones de prevención y tratamiento alrededor de los dos casos confirmados en las zonas de salud Biena y Mandima.
- Las actividades de prevención y control de infecciones (IPC, por sus siglas en inglés) y de agua, saneamiento e higiene (WASH, también por sus siglas en inglés) continúan con la descontaminación de instalaciones de salud y hogares en las zonas de salud Beni, Mandima, Kaluguta, Oicha y Katwa; ciento cincuenta higienistas, que representan a 18 áreas de salud en Beni, fueron capacitados en descontaminación comunitaria.
- Los mensajes de sensibilización y movilización de la comunidad se están actualizando, revisando y armonizando y han sido probados previamente por la comisión y posteriormente serán compartidos en actividades de coordinación y subcoordinación.
- En Beni, se celebró una sesión de conversación con la población del área de salud Rwangoma, con el apoyo del jefe, para mejorar la aceptación de las acciones de respuesta en torno a los confirmados; En Lubero, se realizó una sesión de intercambio con mujeres líderes en el área de salud Kipese para fortalecer la participación de las mujeres en la gestión de los incidentes comunitarios y la respuesta contra la EVE en dicha zona de salud.

Interpretación de la situación por la OMS

Nuevos casos de EVE continúan ocurriendo en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. La confirmación de un caso en la ciudad de Goma ha sido anticipada durante mucho tiempo y ha habido un intenso trabajo de preparación en los últimos seis meses. Casi 3000 trabajadores de la salud ya han sido vacunados y centros de salud han recibido capacitación y equipos intensivos para mejorar la prevención y control de infecciones, mientras que los equipos de vigilancia verifican numerosas alertas cada semana. Equipos de entierros seguros y dignos han sido capacitados y equipados y se han realizado extensas campañas de sensibilización de la comunidad, junto con los controles de PoC en los cruces fronterizos. Sin embargo, la transmisión continua en los principales puntos afectados y la participación de nuevas áreas de salud son de gran preocupación, se pide la continuación de intervenciones de control de brotes fuertes y novedosos en todas las áreas afectadas. También hay una necesidad urgente de proporcionar los recursos necesarios, especialmente la financiación, para apoyar y mantener las operaciones de respuesta en curso a lo largo de una amplia extensión geográfica, aún más importante por la ocurrencia de un caso en la populosa ciudad de Goma.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

BOLETÍN SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL

OTROS EVENTOS DE LA SEMANA

Cuba

⇒ Intercambian en Holguín sobre resultados del tratamiento de un tipo de cáncer de piel

⇒ Recibe Cuba distinción de la ONU por logros en el sistema de salud pública

⇒ Profesionales más sensibles, abnegados y necesarias de nuestro sistema nacional de salud

El mundo

⇒ Situación del ébola en la República Democrática del Congo

⇒ Virus del Ébola en Uganda

⇒ Actualización Epidemiológica de dengue en las Américas

⇒ Alerta epidemiológica de rubéola en las Américas

⇒ Actualización Epidemiológica de sarampión en las Américas

⇒ Actualización epidemiológica de influenza

⇒ Dengue, virus del Zika y chikungunya en Bolivia

⇒ Dengue, virus del Zika y chikungunya en Colombia

⇒ Dengue, virus del Zika y chikungunya en El Salvador

⇒ Dengue, virus del Zika y chikungunya en Guatemala

⇒ Dengue, virus del Zika y chikungunya en México

⇒ Dengue en Panamá

⇒ Malaria en Colombia

⇒ Malaria en México

⇒ Sarampión en Colombia

⇒ Sarampión en Estados Unidos

⇒ Cólera en Haití

Noticias

⇒ Eliminan VIH de genes de varios ratones mediante técnicas combinadas

⇒ Descubren el mecanismo que vuelve a los niños más susceptibles a la sepsis

Recomendamos leer

La leche materna incluye azúcares que pueden ser potenciales anti-rotavirus de la diarrea, según un estudio

Una investigación del departamento de Microbiología de la Universidad de Valencia (UV), el Instituto de Biomedicina de Valencia y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC demuestra que algunos azúcares presentes de forma natural en la leche materna son idénticos a los receptores del virus, lo que evidencia su potencial como anti-rotavirus.

Este proyecto define por primera vez la interacción inicial que se produce rotavirus humano 'P [8]' -(principal causante de la gastroenteritis) y determinados receptores de la mucina (capa protectora del intestino compuesta por proteínas y azúcares) y el epitelio intestinal. El estudio, publicado en la revista *Plos Pathogens* pone en evidencia la relevancia de la lactancia materna como protectora frente a la infección por rotavirus. Leer más…

ARTE Y MEDICINA

Unos síndromes muy literarios

El síndrome de Peter Pan, de Rapunzel, de Dorian Gray, de Madame Bovary, de Otelo, de Münchhausen… todas ellas son patologías más o menos conocidas, pero seguro que a la mayoría le suena el nombre del personaje literario que reciben en cada caso. Te hablaremos de dos de ellos cuyos protagonistas son archiconocidos: el primero, **Alicia, la del país de las maravillas**, y el segundo, **Huckleberry Finn**, el de las aventuras.

El síndrome de «Alicia en el país de las maravillas»

Cuando Lewis Carroll (en realidad es el seudónimo del escritor británico Charles Lutwidge Dodgson) la publicó en 1865, no se imaginaría que cien años después, un ejemplar de esa primera edición se convertiría en el libro para niños más caro jamás vendido, concretamente 1,5 millones de dólares, y tampoco sospecharía que entre los idiomas que se traduciría se incluyera el esperanto.

En su capítulo IV, Alicia ve pasar al conejo blanco que está buscando su abanico, y tras confundirla con su criada, le exige que lo busque en su casa junto a un par de guantes blancos. Al entrar, Alicia sube a un cuarto donde encuentra el abanico y una botella. Su curiosidad puede más que su sensatez y bebe de ella, aumentando y aumentado de tamaño hasta ser tan grande como la misma casa. Por suerte, los vecinos le arrojan unos panecillos mágicos por la ventana que tras comerlos consigue disminuir su tamaño.

Esta fantasía vivida por Alicia en su país de las maravillas tiene su traducción en la realidad. La distorsión en la percepción de la imagen y del tamaño del cuerpo, así como de la distancia, la forma y el tiempo, es un raro cuadro clínico que se da más frecuentemente en jóvenes dentro de un contexto de migrañas, fiebre, epilepsia, infecciones víricas como la varicela, la gripe o el virus de Epstein-Barr, entre otros, y en ocasiones por el consumo de drogas como la marihuana, la mescalina, el LSD y fármacos como el clomifeno y antidepresivos… Puede que estas distorsiones se repitan en varias ocasiones al día, pero antes o después, desaparecen.

Descrito por primera vez en 1952 por el psiquiatra C. W. Lippman, el paciente se ve las manos más grandes, las llaves de casas más pequeñas, por poner solo un par de ejemplos, y la causa exacta que lo origina continúa sin estar clara. Casi siempre, las pruebas diagnósticas por imagen como la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada y el electroencefalograma son normales. Puede que otros estudios durante la fase aguda puedan evidenciar leves alteraciones, sin que tampoco puedan asociarse a la misma.

Hay que insistir en que es una alteración de la percepción, no de la visión, es decir, se interpreta erróneamente lo que se ve, y es un síndrome que no reviste ninguna gravedad a pesar de que el paciente se sienta alarmado e, incluso, entre en pánico. El descanso y los grupos de apoyo son los principales tratamientos.

Un caso de síndrome de Alicia en el país de las maravillas publicado en Anales de Pediatría.

ARTE Y MEDICINA

El síndrome de «Huckleberry Finn»

El personaje imaginado por Mark Twain era un muchacho que hacía novillos para irse con su amigo Tom Sawyer a correr mil y una aventuras, entre ellas la vivida a lo largo del río Mississippi, junto a Jim, el esclavo. Pero analicemos los personajes…

Tom Sawyer, educado en un ambiente familiar tranquilo, su monótona vida le hace buscar la diversión fuera de su casa, en cambio, la vida de Huckleberry Finn, más complicada tras ser abandonado, se ve obligado a crecer más rápido, y su malvado padrastro no le ayudó mucho que digamos y empeoró su situación, debiendo escapar.

Puede que muchos, a diferencia del anterior síndrome, puedan verse reflejados en este. Es un trastorno psicológico en el que la persona tiende a eludir sus responsabilidades tanto de niño como después en la vida adulta. Suelen ser personas que cambian repetidamente de trabajos, con baja autoestima que acabará con síntomas de depresión, además, su rechazo parenteral les provocará un mecanismo de defensa. Pero esta compleja personalidad esconde una persona inteligente. Suelen adaptarse a las situaciones que le presenta la vida, no son felices con lo que hacen, evitan tener responsabilidades y buscan experimentar cosas que les haga sentirse bien.

Es curioso comprobar la influencia que tiene la literatura y otras artes a la hora de poner nombre a síndromes o enfermedades. Pero los tiempos cambian y palabras como nomofobia, cibercondría o el denominado síndrome de Google, acaben por ser aceptados por las sociedades médicas, unas patologías aparecidas por las nuevas tecnologías. Si es que el ser humano, cuando no tiene problemas, termina por buscarlos y encontrarlos. **En fin… si te interesa que continúe con el tema, solicítalo y seguiremos investigando sobre más síndromes literarios.**

Situación Epidemiológica Internacional es una publicación oficial de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Su frecuencia es semanal en formato electrónico.

Director: Dr. Lorenzo Somarriba López.

Asesor: Dr. Germán Carrera Cánova.

Edición: MSc. Sania Cisneros Velázquez.

Compilación: MSc. Sania Cisneros Velázquez/Dra. Liane Castro Benítez.

Dirección Postal: Calle 23 No. 201 entre M y N, Vedado, Plaza,

La Habana, Cuba. CP: 10 400.

Teléfono: (537) 8396273.

DVS
Dirección de Vigilancia en Salud
Cuba-MINSAP